



Situation observée en médecine générale pour la semaine 27 de l'année 2022, du 04 au 10/07/22

Infection respiratoire aiguë (IRA)

Covid-19, Grippe et autres virus respiratoires
Activité modérée en médecine générale



Carte d'interpolation spatiale des taux d'incidence départementaux



En France métropolitaine, la semaine dernière (2022s27), le taux d'incidence des cas d'infection respiratoire aiguë (IRA) vus en consultation de médecine générale a été estimé à **189 cas pour 100 000 habitants (IC 95% [169 ; 209])**. Ce taux est **en augmentation** par rapport à la semaine 2022s26 (données consolidées : 130 [117 ; 143]).


- Données sur la Covid-19 : page 2

- Données nationales et régionales complètes : page 3


Les IRA sont dues à différents virus respiratoires comme le SARS-CoV-2 (Covid-19), les virus grippaux, ainsi qu'à d'autres virus respiratoires (VRS, rhinovirus ou métapneumovirus). La surveillance des IRA a pour objectif le suivi des épidémies dues à ces virus.

Diarrhée aiguë

Activité faible en médecine générale



Carte d'interpolation spatiale des taux d'incidence départementaux




En France métropolitaine, la semaine dernière (2022s27), le taux d'incidence des cas de diarrhée aiguë vus en consultation de médecine générale a été estimé à **71 cas pour 100 000 habitants (IC 95% [58 ; 84])**. Ce taux est **stable** par rapport à la semaine 2022s26 (données consolidées : 56 [47 ; 65]) et est à un niveau d'activité inférieur à ceux observés habituellement en cette période.

Les données nationales et régionales complètes sont disponibles en dernière page de ce bulletin.


La surveillance des diarrhées aiguës a pour objectif le suivi des épidémies de gastro-entérites.

Varicelle

Activité modérée en médecine générale



Carte d'interpolation spatiale des taux d'incidence départementaux



En France métropolitaine, la semaine dernière (2022s27), le taux d'incidence des cas de varicelle vus en consultation de médecine générale a été estimé à **36 cas pour 100 000 habitants (IC 95% [25 ; 47])**. Ce taux est **en augmentation** par rapport à la semaine 2022s26 (données consolidées : 25 [19 ; 31]) et est à un niveau d'activité comparable à ceux observés habituellement en cette période.

Les données nationales et régionales complètes sont disponibles en dernière page de ce bulletin.

Situation observée en médecine générale pour la semaine 27 de l'année 2022, du 04 au 10/07/22

COVID-19

Modalités de la surveillance de la Covid-19 par le réseau Sentinelles


Le réseau Sentinelles contribue à la surveillance de l'épidémie de Covid-19 grâce à la surveillance des cas d'infection respiratoire aiguë (IRA) vus en consultation de médecine générale (*définie par une fièvre ou une sensation de fièvre accompagnée de signes respiratoires*).

Pour chaque patient présentant une IRA déclaré par les médecins généralistes Sentinelles, des données descriptives sont recueillies, dont les résultats des tests diagnostiques vis-à-vis de la Covid-19 (RT-PCR ou test antigénique).

À partir de ces informations, il est possible d'estimer le nombre de cas de Covid-19 présentant des signes respiratoires vus en consultations de médecine générale. Ces cas représentent une part majoritaire de l'ensemble des cas de Covid-19 vus en consultation de médecine générale. Il est toutefois important de noter que les cas de Covid-19 ne présentant pas de signes respiratoires ne sont pas inclus dans nos estimations, comme ceux présentant une agueusie ou une anosmie isolée.

Cet indicateur permet de disposer d'estimations comparables au cours du temps pour surveiller la dynamique de l'épidémie.


Taux de positivité des IRA au SARS-CoV-2 (Covid-19) par tranches d'âge



Nombre d'IRA déclarées par les médecins Sentinelles et taux de positivité au SARS-CoV-2 (Covid-19) depuis 2020s37

En semaine 2022s27, le taux de positivité au SARS-CoV-2 (Covid-19) des patients consultant pour une IRA était de 19%, 56% et 59%, respectivement chez les 0-14, 15-64 et 65 ans et plus.

Estimation de l'incidence des cas de Covid-19 présentant des signes respiratoires



Taux d'incidence des cas de Covid-19 présentant des signes respiratoires vus en médecine générale depuis 2020s37

En semaine 2022s27, le taux d'incidence des cas de Covid-19 présentant des signes respiratoires vus en consultation de médecine générale a été estimé à 90 cas pour 100 000 habitants (IC 95% [78 ; 103]), ce qui représente 59 965 [51 778 ; 68 152] nouveaux cas de Covid-19 présentant des signes respiratoires ayant consulté un médecin généraliste.

Ce taux est en forte augmentation par rapport à ceux des dernières semaines (données consolidées pour 2022s26 : 67 [58 ; 76], soit 44 165 [38 204 ; 50 126] nouveaux cas de Covid-19 présentant des signes respiratoires vus en médecine générale).

Description clinique des cas de Covid-19 présentant des signes respiratoires

Depuis la semaine 2021s52 (lors de laquelle le variant Omicron est devenu majoritaire en France métropolitaine), les 4 699 cas de Covid-19 présentant des signes respiratoires vus par les médecins généralistes Sentinelles présentaient les caractéristiques suivantes :

- Leur âge médian était de 44 ans (de 1 mois à 104 ans) et 57% (2 637/4 619) étaient des femmes ;
- 23% (911/3 986) des patients âgés de 12 ans ou plus n'étaient pas vaccinés contre la Covid-19 (aucune dose de vaccin reçue) ;
- 25% (918/3 633) avaient des facteurs de risque de complication ;
- 1% (45/3 629) ont été hospitalisés à l'issue de leur consultation.

Ces caractéristiques sont proches de celles des cas de Covid-19 présentant des signes respiratoires vus en consultation de médecine générale depuis le début de la pandémie et jusqu'à la semaine 2021s51 (âge médian : 45 ans ; 57% de femmes ; 25% présentant des facteurs de risque ; 5% de patients hospitalisés).

En conclusion

L'incidence des cas de Covid-19 présentant des signes respiratoires, vus en consultation de médecine générale est en forte augmentation depuis six semaines consécutives.

Vous pouvez retrouver le bulletin épidémiologique de Santé publique France avec l'ensemble des données de surveillance (ambulatoire et hospitalière) sur l'épidémie COVID-19 en cliquant [ici](#).

Situation observée en médecine générale pour la semaine 27 de l'année 2022, du 04 au 10/07/22

Taux d'incidence nationaux sur les trois dernières semaines (pour 100 000 habitants)	2022s27 (non consolidé) Estimation du taux d'incidence [Intervalle de confiance à 95%]	2022s26 Estimation du taux d'incidence [Intervalle de confiance à 95%]	2022s25 Estimation du taux d'incidence [Intervalle de confiance à 95%]
Infection Respiratoire Aiguë	189 [169 ; 209]	130 [117 ; 143]	100 [89 ; 111]
Diarrhée aiguë	71 [58 ; 84]	56 [47 ; 65]	58 [49 ; 67]
Varicelle	36 [25 ; 47]	25 [19 ; 31]	34 [28 ; 40]

Taux d'incidence régionaux pour la semaine 2022s27 (pour 100 000 habitants)	Infection Respiratoire Aiguë Estimation du taux d'incidence [Intervalle de confiance à 95%]	Diarrhée aiguë Estimation du taux d'incidence [Intervalle de confiance à 95%]	Varicelle Estimation du taux d'incidence [Intervalle de confiance à 95%]
Auvergne-Rhône-Alpes	90 [54 ; 126]	37 [13 ; 61]	36 [6 ; 66]
Bourgogne-Franche-Comté	72 [13 ; 131]	29 [0 ; 71]	24 [0 ; 51]
Bretagne	257 [170 ; 344]	51 [16 ; 86]	47 [11 ; 83]
Centre-Val de Loire	310 [124 ; 496]	27 [0 ; 75]	17 [0 ; 39]
Corse	238 [127 ; 349]	47 [0 ; 96]	14 [0 ; 39]
Grand Est	326 [235 ; 417]	100 [40 ; 160]	36 [8 ; 64]
Hauts-de-France	175 [96 ; 254]	96 [42 ; 150]	6 [0 ; 19]
Ile-de-France	186 [141 ; 231]	53 [28 ; 78]	25 [11 ; 39]
Normandie	70 [0 ; 154]	32 [0 ; 98]	44 [0 ; 156]
Nouvelle-Aquitaine	183 [121 ; 245]	64 [29 ; 99]	41 [7 ; 75]
Occitanie	159 [102 ; 216]	82 [34 ; 130]	48 [0 ; 101]
Pays de la Loire	220 [89 ; 351]	105 [23 ; 187]	15 [0 ; 36]
Provence-Alpes-Côte d'Azur	270 [159 ; 381]	99 [43 ; 155]	46 [9 ; 83]

Réseau Sentinelles

Institut Pierre Louis d'Epidémiologie et de Santé Publique

UMR-S 1136 (Inserm - Sorbonne Université)

Téléphone : 01 44 73 84 35 | Courriel : sentinelles@upmc.fr

Depuis 1984, le réseau Sentinelles est un réseau de recherche et de veille sanitaire en soins primaires (médecine générale et pédiatrie) en France métropolitaine. La participation des médecins libéraux est bénévole et volontaire. Actuellement, 617 médecins participent à l'activité de surveillance continue (576 généralistes et 41 pédiatres libéraux), permettant la réalisation des bulletins hebdomadaires.

Responsables du réseau Sentinelles : Olivier Steichen, Thierry Blanchon

Publication : Yves Dorléans

Système d'information et biostatistique : Ibrahima Camara, Olivier Garcia, Titouan Launay, Clément Turbelin, Ana Vilcu

Surveillance continue et études ponctuelles : Thomas Hanslik, Caroline Guerrisi, Louise Rossignol

Antenne régionale	Responsables & Epidémiologistes/Animateurs
Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté	Marianne Sarazin Caroline Liotard
Centre-Val de Loire, Pays de la Loire, Bretagne	Thierry Prazuck Charly Kengne-Kuetche, Marie Pouquet
Corse, PACA	Alessandra Falchi Shirley Masse, Julie Sevila
Grand Est	Daouda Niaré
Ile-de-France, Hauts-de-France	Mathilde François Camille Bonnet, Hayat Benamar
Normandie	Justine Ducher
Nouvelle-Aquitaine, Occitanie	Maryse Lapeyre-Mestre Marion Debin, Yves Dorléans

Vous avez besoin d'information ?

Vous pouvez consulter notre site internet :

<https://www.sentiweb.fr/>

N'hésitez pas à nous contacter aux coordonnées ci-contre

Vous êtes médecin généraliste ou pédiatre ?

Vous pouvez rejoindre le réseau Sentinelles et participer à la recherche et à la veille sanitaire en soins primaires

<https://www.sentiweb.fr/france/fr/inscrire>

Envie de participer à la veille sanitaire ?

covidnet.fr

Devenez acteur de la surveillance du Covid-19 !

Pas besoin d'être malade pour participer !

Inscrivez-vous sur <https://www.covidnet.fr/>