



Situation observée en médecine générale pour la semaine 23 de l'année 2022, du 06 au 12/06/22

## Infection respiratoire aiguë (IRA) (COVID-19, GRIPPE et autres virus respiratoires) Activité faible en médecine générale



Carte d'interpolation spatiale des taux d'incidence départementaux



**En France métropolitaine**, la semaine dernière (2022s23), le taux d'incidence des cas d'infection respiratoire aiguë (IRA) vus en consultation de médecine générale a été estimé à **92 cas pour 100 000 habitants (IC 95% [79 ; 105])**. Ce taux est en **légère augmentation** par rapport à la semaine 2022s22 (données consolidées : 69 [60 ; 78]).


- Données sur la grippe : page 2

- Données sur la COVID-19 : page 3


- Données nationales et régionales complètes : page 5

Les IRA sont dues à différents virus respiratoires comme le SARS-CoV-2 (COVID-19) ou les virus grippaux, ainsi qu'à d'autres virus respiratoires (VRS, rhinovirus ou métagpneumovirus). La surveillance des IRA a pour objectif le suivi des épidémies dues à ces virus.

## Diarrhée aiguë Activité faible en médecine générale



Carte d'interpolation spatiale des taux d'incidence départementaux




**En France métropolitaine**, la semaine dernière (2022s23), le taux d'incidence des cas de diarrhée aiguë vus en consultation de médecine générale a été estimé à **68 cas pour 100 000 habitants (IC 95% [55 ; 81])**. Ce taux est **stable** par rapport à la semaine 2022s22 (données consolidées : 57 [48 ; 66]) et est à un niveau d'activité inférieur à ceux observés habituellement en cette période.


Les données nationales et régionales complètes sont disponibles en dernière page de ce bulletin.

La surveillance des diarrhées aiguës a pour objectif le suivi des épidémies de gastro-entérites.

## Varicelle Activité modérée en médecine générale



Carte d'interpolation spatiale des taux d'incidence départementaux




**En France métropolitaine**, la semaine dernière (2022s23), le taux d'incidence des cas de varicelle vus en consultation de médecine générale a été estimé à **27 cas pour 100 000 habitants (IC 95% [20 ; 34])**. Ce taux est **stable** par rapport à la semaine 2022s22 (données consolidées : 29 [23 ; 35]) et est à un niveau d'activité comparable à ceux observés habituellement en cette période.

Les données nationales et régionales complètes sont disponibles en dernière page de ce bulletin.

Situation observée en médecine générale pour la semaine 23 de l'année 2022, du 06 au 12/06/22

## GRIPPE


### Taux d'incidence des syndromes grippaux et comparaison aux données historiques



Taux d'incidence national et comparaison avec les données historiques (2021/12 à 2018/19)


En semaine 2022s23, le taux d'incidence des cas de syndromes grippaux vus en consultation de médecine générale a été estimé à 44 cas pour 100 000 habitants (IC 95% [34 ; 54]). Ce taux est **stable** par rapport à la semaine précédente.

### Taux d'incidence des syndromes grippaux par tranches d'âge



En semaine 2022s23, les taux d'incidence des syndromes grippaux sont stables dans l'ensemble des tranches d'âge par rapport à la semaine précédente.

### Circulation des virus grippaux



Taux de positivité à la grippe cumulé selon les sous-types de virus grippaux circulants à partir des cas d'IRA prélevés par les médecins Sentinelles depuis 2021s37

En semaine 2022s23, 18 patients présentant une IRA vus en consultation de médecine générale ou pédiatrie ont été prélevés dans le cadre de la surveillance Sentinelles (prélèvements salivaires). Parmi eux, 6,7% (1/15) étaient positifs pour un virus grippal (données consolidées pour la semaine précédente 2022s22 : 3,7% (1/27)).

#### Description des cas de grippe :

Au total, depuis le début de la saison de surveillance en septembre 2021 (semaine 2021s37), 806 cas de grippe ont été confirmés parmi les 2 797 cas d'IRA prélevés et analysés pour ce virus (28,8%).

Ces cas de grippe étaient dus :


- Au virus grippal A(H1N1)pdm09 pour 247 (31%) d'entre eux ;
- Au virus grippal A(H3N2) pour 537 (67%) d'entre eux ;
- A un virus grippal de type A, non sous-typé, pour 19 (2%) d'entre eux ;
- A une co-infection A(H1N1) pdm09 et A(H3N2) pour 3 (0,3%) d'entre eux.

Aucun virus de type B n'a été isolé.

Les cas de grippe confirmés présentaient les caractéristiques suivantes :

- Leur âge médian était de 20 ans (de 1 mois à 86 ans) ;
- 51% (403/797) étaient des femmes ;
- 14% (110/788) avaient des facteurs de risque de complication ;
- Deux patients (2/763) ont été hospitalisés à l'issue de la consultation.

### Efficacité du vaccin contre la grippe saisonnière



En rouge : saison 2021-2022 / En noir : saisons de 2014-2015 à 2019-2020

L'efficacité du vaccin contre la grippe cette saison est estimée à **44% (IC95% [18% ; 62%])**. Cette efficacité est proche de celles des dernières saisons.

L'efficacité de ce vaccin est de 29% [-9% ; 54%] contre le virus grippal de sous-type A(H3N2) et de 82% [55% ; 92%] contre celui de sous-type A(H1N1)pdm09.

Ces estimations seront affinées dans les semaines à venir.

*\*Absence de circulation active des virus grippaux durant la saison 2020/2021*

### Conclusion

L'épidémie de grippe est terminée en France métropolitaine. Des virus grippaux continuent de circuler de façon sporadique.

Vous pouvez retrouver le bulletin épidémiologique de Santé publique France avec l'ensemble des données de surveillance (ambulatoire et hospitalière) sur la grippe en cliquant [ici](#).

Situation observée en médecine générale pour la semaine 23 de l'année 2022, du 06 au 12/06/22

## COVID-19


### Modalités de la surveillance de la COVID-19 par le réseau Sentinelles

La surveillance des IRA effectuée par le réseau Sentinelles permet de suivre la dynamique de l'épidémie de COVID-19 en médecine générale en France métropolitaine.

Pour chaque patient présentant une IRA déclaré par les médecins généralistes Sentinelles, des données descriptives sont recueillies, dont les résultats des tests diagnostiques vis-à-vis de la COVID-19 (recherche du SARS-CoV-2 par RT-PCR ou test antigénique).

L'incidence des IRA dues à la COVID-19 vues en consultation de médecine générale est estimée à partir de l'incidence des IRA et du taux de positivité des IRA au SARS-CoV-2.


### Taux de positivité des IRA au SARS-CoV-2 par tranches d'âge



Nombre d'IRA déclarées par les médecins Sentinelles et taux de positivité au SARS-CoV-2 depuis 2020s37

**En semaine 2022s23**, le taux de positivité au SARS-CoV-2 des patients consultant pour une IRA était de 7%, 38% et 45%, respectivement chez les 0-14, 15-64 et 65 ans et plus.

### Estimation de l'incidence des IRA dues à la COVID-19



Taux d'incidence des IRA dues au SARS-CoV-2 (COVID-19) vues en médecine générale depuis 2020s37

**En semaine 2022s23**, le taux d'incidence des IRA dues au SARS-CoV-2 (COVID-19) vues en consultation de médecine générale a été estimé à 31 cas pour 100 000 habitants (IC 95% [25 ; 36]), ce qui représente 20 277 [16 436 ; 24 118] nouveaux cas de COVID-19 ayant consulté un médecin généraliste.

Ce taux est en augmentation par rapport à ceux des dernières semaines (données consolidées pour 2022s22 : 18 [14 ; 21], soit 11 805 [9 556 ; 14 054] nouveaux cas d'IRA dus à la COVID-19 vus en médecine générale).

### Description clinique des IRA dues à la COVID-19

Depuis la semaine 2021s52 (lors de laquelle le variant Omicron est devenu majoritaire en France métropolitaine), les 4 051 cas d'IRA positifs au SARS-CoV-2 (COVID-19) vus par les médecins généralistes Sentinelles présentaient les caractéristiques suivantes :

- Leur âge médian était de 44 ans (de 1 mois à 104 ans) et 57% (2 271/3 983) étaient des femmes ;
- 24% (828/3 412) des patients âgés de 12 ans ou plus n'étaient pas vaccinés contre la COVID-19 (aucune dose de vaccin reçue) ;
- 24% (767/3 132) avaient des facteurs de risque de complication ;
- 1% (42/3 131) ont été hospitalisés à l'issue de leur consultation.

Ces caractéristiques sont proches de celles des IRA dues à la COVID-19 vues en consultation de médecine générale depuis le début de la pandémie et jusqu'à la semaine 2021s51 (âge médian : 45 ans ; 57% de femmes ; 25% présentant des facteurs de risque ; 5% de patients hospitalisés).

### En conclusion

L'incidence des IRA dues à la COVID-19 vues en consultation de médecine générale est basse mais en augmentation par rapport à la semaine précédente (2022s22).

Vous pouvez retrouver le bulletin épidémiologique de Santé publique France avec l'ensemble des données de surveillance (ambulatoire et hospitalière) sur l'épidémie COVID-19 en cliquant [ici](#).

Situation observée en médecine générale pour la semaine 23 de l'année 2022, du 06 au 12/06/22

## Données complémentaires sur les infections respiratoires aiguës


### Modalités de la surveillance des IRA par le réseau Sentinelles

Chaque année, des virus à tropisme respiratoire circulent en France métropolitaine entraînant des infections respiratoires aiguës (IRA). Ces virus sont principalement les virus grippaux, et d'autres virus respiratoires comme le virus respiratoire syncytial (VRS), le rhinovirus ou le métapneumovirus, mais aussi le SARS-CoV-2 (COVID-19) depuis 2020. Ils nécessitent une surveillance rapprochée, car ils peuvent être la cause d'épidémies plus ou moins sévères.

Pour effectuer cette surveillance en médecine de ville, les médecins généralistes Sentinelles rapportent depuis le 17 mars 2020 le nombre de cas d'IRA vus en consultation (ou téléconsultation), selon la définition suivante : apparition brutale de fièvre (ou sensation de fièvre) et de signes respiratoires. Une surveillance virologique est également réalisée par les médecins généralistes et pédiatres Sentinelles, avec le prélèvement d'un échantillon des cas d'IRA vus en consultation, afin d'identifier les virus circulants.


Cette veille est effectuée en collaboration avec Santé publique France, le Centre national de référence (CNR) des infections respiratoires (Institut Pasteur à Paris et Hospices Civils de Lyon), et l'Université de Corse.

### Taux d'incidence des IRA par tranches d'âge



En semaine 2022s23, les taux d'incidence sont stables dans la tranche des moins de 15 ans et en légère augmentation dans les tranches d'âges supérieures.

### Circulation des virus respiratoires



Nombre de prélèvements réalisés et taux de positivité des virus respiratoires à partir des cas d'IRA prélevés par les médecins Sentinelles depuis 2021s37

En semaine 2022s23, 18 patients présentant une IRA vus en consultation de médecine générale ou pédiatrie ont été prélevés dans le cadre de la surveillance Sentinelles (prélèvements salivaires). Ces prélèvements sont testés pour différents virus respiratoires, dont le SARS-CoV-2 (COVID-19) et les virus grippaux :


- 1/15 (6,7%) était positif pour un virus grippal (données consolidées pour 2022s22 : 1/27 (3,7%)) ;
- Aucun n'était positif au SARS-CoV-2 (COVID-19) (0/18 testés) (données consolidées pour 2022s22 : 8/27 (29,6%)) ;
- 4/15 (26,7%) étaient positifs au rhinovirus (hRV) (données consolidées pour 2022s22 : 2/27 (7,4%)) ;
- Aucun n'était positif au virus respiratoire syncytial (VRS) (0/15 testés) (données consolidées pour 2022s22 : 1/26 (3,8%)) ;
- Aucun n'était positif au métapneumovirus (hMPV) (0/15 testés) (données consolidées pour 2022s22 : (0/26 testés)).

Depuis la semaine 2021s37 (13 septembre 2021), 2 799 patients présentant une IRA vus en consultation de médecine générale et pédiatrie ont été prélevés. Les résultats des tests virologiques effectués en fonction des semaines sont présentés dans le graphique ci-dessus.

Douze co-infections "Grippe+COVID-19" ont été observées :

- Cinq co-infections A(H1N1)pdm09/SARS-CoV-2 en semaines 2021s48, 2022s03, 2022s05, 2022s08 et 2022s14 ;
- Sept co-infections A(H3N2)/SARS-CoV-2 en semaines 2022s03, 2022s07, 2022s08, 2022s10, 2022s13, 2022s15 et 2022s16.

### Evolution des incidences des IRA par régions



Taux d'incidence hebdomadaire des IRA par régions

### En conclusion

L'incidence des IRA vues en consultation de médecine générale est faible mais en légère augmentation par rapport à la semaine précédente 2022s22.

## Situation observée en médecine générale pour la semaine 23 de l'année 2022, du 06 au 12/06/22

Taux d'incidence nationaux sur les trois dernières semaines (pour 100 000 habitants)	2022s23 (non consolidé) Estimation du taux d'incidence [Intervalle de confiance à 95%]	2022s22 Estimation du taux d'incidence [Intervalle de confiance à 95%]	2022s21 Estimation du taux d'incidence [Intervalle de confiance à 95%]
Infection Respiratoire Aiguë	92 [79 ; 105]	69 [60 ; 78]	54 [46 ; 62]
Diarrhée aiguë	68 [55 ; 81]	57 [48 ; 66]	42 [35 ; 49]
Varicelle	27 [20 ; 34]	29 [23 ; 35]	31 [25 ; 37]

Taux d'incidence régionaux pour la semaine 2022s23 (pour 100 000 habitants)	Infection Respiratoire Aiguë Estimation du taux d'incidence [Intervalle de confiance à 95%]	Diarrhée aiguë Estimation du taux d'incidence [Intervalle de confiance à 95%]	Varicelle Estimation du taux d'incidence [Intervalle de confiance à 95%]
Auvergne-Rhône-Alpes	83 [49 ; 117]	48 [19 ; 77]	24 [3 ; 45]
Bourgogne-Franche-Comté	17 [0 ; 49]	55 [0 ; 112]	17 [0 ; 45]
Bretagne	96 [51 ; 141]	108 [58 ; 158]	38 [8 ; 68]
Centre-Val de Loire	21 [0 ; 42]	63 [0 ; 135]	7 [0 ; 16]
Corse	128 [49 ; 207]	119 [9 ; 229]	10 [0 ; 51]
Grand Est	124 [67 ; 181]	95 [47 ; 143]	39 [3 ; 75]
Hauts-de-France	115 [47 ; 183]	107 [35 ; 179]	21 [0 ; 60]
Ile-de-France	84 [56 ; 112]	32 [17 ; 47]	28 [15 ; 41]
Normandie	48 [5 ; 91]	35 [0 ; 73]	0 [0 ; 0]
Nouvelle-Aquitaine	82 [43 ; 121]	52 [17 ; 87]	25 [0 ; 52]
Occitanie	100 [55 ; 145]	68 [34 ; 102]	19 [2 ; 36]
Pays de la Loire	45 [16 ; 74]	39 [11 ; 67]	23 [1 ; 45]
Provence-Alpes-Côte d'Azur	131 [63 ; 199]	9 [0 ; 23]	17 [0 ; 43]

## Réseau Sentinelles

### Institut Pierre Louis d'Epidémiologie et de Santé Publique

UMR-S 1136 (Inserm - Sorbonne Université)

Téléphone : 01 44 73 84 35 | Courriel : [sentinelles@upmc.fr](mailto:sentinelles@upmc.fr)

Depuis 1984, le réseau Sentinelles est un réseau de recherche et de veille sanitaire en soins primaires (médecine générale et pédiatrie) en France métropolitaine. La participation des médecins libéraux est bénévole et volontaire. Actuellement, 621 médecins participent à l'activité de surveillance continue (579 généralistes et 42 pédiatres libéraux), permettant la réalisation des bulletins hebdomadaires.

**Responsables du réseau Sentinelles** : Olivier Steichen, Thierry Blanchon

**Publication** : Yves Dorléans

**Système d'information et biostatistique** : Ibrahima Camara, Olivier Garcia, Titouan Launay, Clément Turbelin, Ana Vilcu

**Surveillance continue et études ponctuelles** : Thomas Hanslik, Caroline Guerrisi, Louise Rossignol

Antenne régionale	Responsables & Epidémiologistes/Animateurs
Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté	<b>Marianne Sarazin</b> Caroline Liotard
Centre-Val de Loire, Pays de la Loire, Bretagne	<b>Thierry Prazuck</b> Charly Kengne-Kuetche, Marie Pouquet
Corse, PACA	<b>Alessandra Falchi</b> Shirley Masse, Julie Sevilla
Grand Est	Daouda Niaré
Ile-de-France, Hauts-de-France	<b>Mathilde François</b> Camille Bonnet, Hayat Benamar
Normandie	Justine Ducher
Nouvelle-Aquitaine, Occitanie	<b>Maryse Lapeyre-Mestre</b> Marion Debin, Yves Dorléans

### Vous avez besoin d'information ?

Vous pouvez consulter notre site internet :

<https://www.sentiweb.fr/>

N'hésitez pas à nous contacter aux coordonnées ci-contre

### Vous êtes médecin généraliste ou pédiatre ?

Vous pouvez rejoindre le réseau Sentinelles et participer à la recherche et à la veille sanitaire en soins primaires

<https://www.sentiweb.fr/france/fr/inscrire>

### Envie de participer à la veille sanitaire ?



Devenez acteur de la surveillance du Covid-19 !

Pas besoin d'être malade pour participer !

Inscrivez-vous sur <https://www.covidnet.fr/>