








Situation observée en médecine générale pour la semaine 6 de l'année 2024, du 05 au 11/02/24

Infection respiratoire aiguë (IRA)

Covid-19, Grippe et autres virus respiratoires Activité forte en médecine générale



Carte d'interpolation spatiale des taux d'incidence départementaux



En France métropolitaine, la semaine dernière (2024s06), le taux d'incidence des cas d'infection respiratoire aiguë (IRA) vus en consultation de médecine générale a été estimé à 443 cas pour 100 000 habitants (IC 95% [417; 469]).


Sous réserve de la consolidation à venir des données, ce taux est en légère diminution depuis deux semaines (données consolidées pour 2024s05 : 454 [431 ; 477]). Retrouvez des informations plus détaillées sur les IRA en page 2, sur la grippe en page 3, sur la Covid-19 en page 4 et sur le VRS en page 5.


Les données nationales et régionales complètes sont disponibles en dernière page

Les IRA sont dues à différents virus respiratoires comme le SARS-CoV-2 (Covid-19), les virus grippaux, ainsi qu'à d'autres virus respiratoires (VRS, rhinovirus ou métapneumovirus). La surveillance des IRA a pour objectif le suivi des épidémies dues à ces virus.

Diarrhée aiguë

Activité modérée en médecine générale





Taux d'incidence national et comparaison avec les données historiques (*)

En France métropolitaine, la semaine dernière (2024s06), le taux d'incidence des cas de diarrhée aiguë vus en consultation de médecine générale a été estimé à 97 cas pour 100 000 habitants (IC 95% [84; 110]).

Sous réserve de la consolidation à venir des données, ce taux est stable par rapport à la semaine précédente (données consolidées pour 2024s05 : 100 [89; 111]) et se trouve parmi les taux les plus bas observés habituellement en cette période. On observe néanmoins une tendance à la diminution depuis trois semaines.


Les données nationales et régionales complètes sont disponibles en dernière page de ce bulletin.

La surveillance des diarrhées aiguës a pour objectif le suivi des épidémies de gastro-entérites.


(*) Les incidences des diarrhées aiguës ont été fortement diminuées entre mars 2020 et août 2021 par les confinements et les mesures sanitaires de lutte contre la pandémie de Covid-19. Elles ne sont pas prises en compte dans les comparaisons historiques.

Varicelle

Activité faible en médecine générale



Carte d'interpolation spatiale des taux d'incidence départementau



Taux d'incidence national et comparaison avec les données historiques (*)

En France métropolitaine, la semaine dernière (2024s06), le taux d'incidence des cas de varicelle vus en consultation de médecine générale a été estimé à 20 cas pour 100 000 habitants (IC 95% [14; 26]).

Sous réserve de la consolidation à venir des données, ce taux est en augmentation par rapport à la semaine précédente (données consolidées pour 2024s05 : 13 [9; 17]) et se trouve à un niveau d'activité similaire à ceux observés habituellement en cette période.

Les données nationales et régionales complètes sont disponibles en dernière page de ce

(*) Les incidences des cas de varicelle durant les saisons 2019/2020 et 2020/2021 ont été fortement diminuées par les confinements et les mesures sanitaires de lutte contre la pandémie de Covid-19. Elles ne sont pas prises en compte dans les comparaisons histo-









Situation observée en médecine générale pour la semaine 6 de l'année 2024, du 05 au 11/02/24

Infection respiratoire aiguë (IRA) - Données complémentaires

Modalités de la surveillance des IRA par le réseau Sentinelles

Chaque année, des virus à tropisme respiratoire circulent en France métropolitaine entrainant des infections respiratoires aiguës (IRA). Ces virus sont principalement le SARS-CoV-2 (COVID-19), le virus respiratoire syncytial (VRS), les virus grippaux, le rhinovirus et le métapneumovirus.


Pour effectuer cette surveillance, les médecins généralistes Sentinelles rapportent le nombre de cas d'IRA vus en consultation (ou téléconsultation), selon la définition suivante : apparition brutale de fièvre (ou sensation de fièvre) et de signes respiratoires.

Pour chaque patient des données descriptives sont aussi recueillies, dont les résultats des tests diagnostiques vis-à-vis de la Covid-19 (RT-PCR ou test antigénique).

Une **surveillance virologique** est également réalisée par les médecins généralistes et pédiatres Sentinelles, qui consiste à prélever chaque semaine un échantillon de patients consultant pour une IRA, afin d'identifier différents virus respiratoires et de suivre leur circulation.

A partir de ces informations cliniques et virologiques, il est possible d'estimer le nombre de cas de Covid-19, de grippe et de VRS parmi les cas d'IRA vus en consultation de médecine générale.


Taux d'incidence des IRA par tranches d'âge



Taux d'incidence nationaux hebdomadaires des IRA par tranches d'âge

La semaine dernière (2024s06), sous réserve de la consolidation à venir des données, les taux d'incidence étaient en légère diminution chez les 0-4 et 5-14 ans et stables dans les autres tranches d'âge par rapport à la semaine précédente.

Circulation des virus respiratoires en médecine générale et pédiatrie libérale




Nombre de prélèvements réalisés et taux de positivité des virus respiratoires à partir des cas d'IRA prélevés par les médecins Sentinelles depuis 2023s39

Cette saison, 286 médecins généralistes et pédiatres participent à la surveillance virologique.

La semaine dernière (2024s06), **165 patients** présentant une IRA vus en consultation de médecine générale ou de pédiatrie ont été prélevés. Les taux de positivité des prélèvements aux différents virus recherchés se répartissaient ainsi :

- **Virus grippaux : 52%** (85/165) (données consolidées 2024s05 : 53% (127/240)) ;
- **SARS-CoV-2 (Covid-19) : 2%** (4/165) (données consolidées 2024s05 : 8% (19/240)) ;
- **Rhinovirus : 5%** (8/164) (données consolidées 2024s05 : 5% (12/240));
- Virus respiratoire syncytial (VRS): 0% (0/165) (données consolidées 2024s05: 2% (5/240));
- **Métapneumovirus : 4%** (7/164) (données consolidées 2024s05 : 6% (14/240)).

Taux d'incidence des IRA par régions



En conclusion

La semaine dernière (2024s06), sous réserve de la consolidation à venir des données, l'incidence des cas d'IRA vus en consultation de médecine générale poursuivait la diminution observée depuis fin janvier (2024s04), et ce principalement chez les enfants de 0-4 ans et 5-14 ans, et dans une moindre mesure chez les 15-64 ans (voir graphique ci-contre).

Les cas d'IRA observés la semaine dernière (2024s06) en médecine générale étaient dus majoritairement à la **circulation des virus grippaux** (voir graphique ci-contre).










Situation observée en médecine générale pour la semaine 6 de l'année 2024, du 05 au 11/02/24

GRIPPE

Estimation de l'incidence des cas de grippe en médecine générale




Taux d'incidence des cas de grippe vus en médecine générale depuis 2023s39 (bleu) et comparaison aux données historiques (gris) (*)

La semaine dernière (2024s06), le taux d'incidence des cas de grippe vus en consultation de médecine générale pour une infection respiratoire aiguë a été estimé à **223 cas pour 100 000 habitants** (IC 95% [193; 253]), soit 148 642 [128 843; 168 441] nouveaux cas.

Sous réserve de la consolidation à venir des données, ce taux est **en légère diminution** par rapport à celui de la semaine précédente (données consolidées pour 2024s05 : 233 [210; 255], soit 155 177 [140 151; 170 203] nouveaux cas).

(*) Afin de pouvoir comparer l'activité actuelle aux épidémies de grippe passées, les incidences présentées sur ce graphique proviennent de l'indicateur syndrome grippal. Ces données sont estimées secondairement à partir de l'indicateur IRA depuis 2020.

Estimation de l'incidence des cas de grippe par tranches d'âge



Taux d'incidence des cas de grippe vus en médecine générale par tranche d'âge depuis 2023s39 (bleu) et comparaison aux données historiques (gris)*


La semaine dernière (2024s06), sous réserve de la consolidation à venir des données, les taux d'incidence des cas de grippe vus en consultation de médecine générale pour une IRA étaient stable chez les 0-14 ans et en légère diminution chez les 15 ans et plus par rapport à la semaine précédente.

Description des cas de grippe

Depuis la reprise de la surveillance virologique en semaine 2023s39 (25 septembre), les **681** cas confirmés de grippe prélevés par les médecins généralistes et les pédiatres Sentinelles présentaient les caractéristiques suivantes :

- Âge médian : 35 ans (de 1 mois à 89 ans);
- Sexe-ratio homme/femme: 0,90 (321/356);
- Vaccination : 91% (577/632) des personnes n'étaient pas vaccinées contre la grippe;
- Facteurs de risque : 18% (97/542) avaient des facteurs de risque de complication ;
- Hospitalisation : un patient a été hospitalisé à l'issue de la consultation (1/502).

Identification des virus grippaux



Taux de positivité à la grippe cumulé selon les sous-types de virus grippaux circulants à partir des cas d'IRA prélevés par les médecins Sentinelles depuis 2023s39

Depuis le début de la surveillance (2023s39), les virus grippaux identifiés étaient majoritairement de type A, avec 75% de grippe A(H1N1)pdm09, 23% de A(H3N2), 2% de grippe A non sous-typés et 0,3% de grippe B Victoria.

En conclusion

La semaine dernière (2024s06), sous réserve de la consolidation à venir des données, l'incidence des cas de **grippe** vus en consultation de médecine générale parmi les patients consultant pour une IRA était **en légère diminution** par rapport à la semaine précédente, mais reste à un **niveau d'activité élevé**. Cette **tendance** à la diminution est observée depuis deux semaines. Le pic épidémique pourrait avoir été atteint fin janvier (2024s04).

Les virus grippaux identifiés sont majoritairement de type A(H1N1)pdm09.

Vous pouvez retrouver le bulletin épidémiologique de Santé publique France avec l'ensemble des données de surveillance (ambulatoire et hospitalière) sur l'épidémie de grippe en cliquant ici.










Situation observée en médecine générale pour la semaine 6 de l'année 2024, du 05 au 11/02/24

Covid-19

Estimation de l'incidence des cas de Covid-19 vus en médecine générale




Taux d'incidence des cas de Covid-19 présentant des signes respiratoires vus en médecine générale depuis 2020s37

La semaine dernière (2024s06), le taux d'incidence des cas de **Covid-19** vus en consultation de médecine générale pour une infection respiratoire aiguë a été estimé à **9 cas pour 100 000** habitants (IC 95% [6; 11]), soit 5 855 [4 047; 7 663] nouveaux cas.

Sous réserve de la consolidation à venir des données, ce taux est **stable** par rapport à celui de la semaine précédente (données consolidées pour 2024s05 : 11 [8; 13], soit 7 116 [5 520; 8 712] nouveaux cas).

Estimation de l'incidence des cas de Covid-19 par tranches d'âge



Taux d'incidence des cas de Covid-19 présentant des signes respiratoires vus en médecine générale par tranche d'âge since 2020s37

La semaine dernière (2024s06), les taux d'incidence des cas de **Covid-19** vus en consultation de médecine générale pour une infection respiratoire aiguë étaient estimés à :

- **0-14 ans** : 0 cas pour 100 000 habitants (IC 95% [0; 1]), soit 48 [6; 90] nouveaux cas;
- **15-64 ans**: 11 cas pour 100 000 habitants (IC 95% [7; 15]), soit 4 463 [2 901; 6 025] nouveaux cas;
- **65 ans et plus**: 9 cas pour 100 000 habitants (IC 95% [4; 14]), soit 1 217 [502; 1 932] nouveaux cas.

Sous réserve de la consolidation à venir des données, ces taux étaient en diminution chez les enfants de 0-14 ans et stables dans les autres tranches d'âges par rapport à la semaine précédente.

Description des cas de Covid-19 présentant des signes respiratoires

Depuis la semaine 2023s39 (25 septembre, date de reprise de la surveillance virologique), les 615 cas confirmés de Covid-19 présentant une infection respiratoire aiguë et prélevés par les médecins généralistes et pédiatres Sentinelles présentaient les caractéristiques suivantes :

- Âge médian: 49 ans (allant de 2 mois à 99 ans);
- Sexe-ratio homme/femme: 0,66 (242/365);
- Vaccination: 21% (122/587) des patients âgés de 12 ans ou plus n'étaient pas vaccinés (aucune dose de vaccin reçue);
- Facteurs de risque : 35% (199/567) avaient des facteurs de risque de complication ;
- **Hospitalisation** : 0,4% (2/534) des patients ont été hospitalisés à l'issue de leur consultation.

En conclusion

La semaine dernière (2024s06), sous réserve de la consolidation à venir des données, l'incidence des cas de **Covid-19** vus en consultation de médecine générale parmi les patients consultant pour une IRA était **stable** par rapport à la semaine précédente et se situait à un **faible niveau d'activité** (voir graphique ci-contre).

Vous pouvez retrouver le bulletin épidémiologique de Santé publique France avec l'ensemble des données de surveillance (ambulatoire et hospitalière) sur l'épidémie Covid-19 en cliquant ici.












Situation observée en médecine générale pour la semaine 6 de l'année 2024, du 05 au 11/02/24

VRS

Estimation de l'incidence des cas de VRS en médecine générale




Taux d'incidence des cas de VRS vus en médecine générale depuis 2023s39 (bleu) et comparaison aux données historiques (gris) (*)

La semaine dernière (2024s06), le taux d'incidence des cas de **VRS** vus en consultation de médecine générale pour une infection respiratoire aiguë a été estimé à **0 cas pour 100 000 habitants**.

Sous réserve de la consolidation à venir des données, ce taux est **en diminution** par rapport à celui de la semaine précédente (données consolidées pour 2024s05 : 10 [5; 15], soit 6 435 [3 040; 9 830] nouveaux cas).

(*) Afin de pouvoir comparer l'activité actuelle aux épidémies de VRS passées, les incidences présentées sur ce graphique proviennent de l'indicateur syndrome grippal. Ces données sont estimées secondairement à partir de l'indicateur IRA depuis 2020.

Estimation de l'incidence des cas de VRS par tranches d'âge



Taux d'incidence des cas de VRS vus en médecine générale par tranches d'âge depuis 2023s39 (bleu) et comparaison aux données historiques (gris)(*)

La semaine dernière (2024s06), les taux d'incidence des cas de **VRS** vus en consultation de médecine générale pour une infection respiratoire aiguë ont été estimés à :

- 0-14 ans: 0 cas pour 100 000 habitants;
- 15 ans et plus : 0 cas pour 100 000 habitants.

Sous réserve de la consolidation à venir des données, ces taux sont en diminution dans les deux tranches d'âge par rapport à la semaine précédente.

(*) Afin de pouvoir comparer l'activité actuelle aux épidémies de VRS passées, les incidences présentées sur ce graphique proviennent de l'indicateur syndrome grippal. Ces données sont estimées secondairement à partir de l'indicateur IRA depuis 2020.

Description des cas de VRS

Depuis la reprise de la surveillance virologique en semaine 2023s39 (25 septembre), les **275** cas confirmés de VRS prélevés par les médecins généralistes et pédiatres Sentinelles présentaient les caractéristiques suivantes :

- Âge médian : 4 ans (de 1 mois à 96 ans) ;
- Sexe-ratio homme/femme: 0,94 (131/140);
- Facteurs de risque : 20% (50/246) avaient des facteurs de risque de complication ;
- **Hospitalisation** : 0,8% (2/241) ont été hospitalisés à l'issue de la consultation.

Ces caractéristiques sont **proches** de celles des cas positifs de VRS observés lors des saisons passées en consultation de médecine générale (données historiques : âge médian : 4 ans; 53% de femmes; 17% présentant des facteurs de risque; 0,6% de patients hospitalisés).

En conclusion

La semaine dernière (2024s06), sous réserve de la consolidation à venir des données, **aucun cas de VRS n'a été identifié** parmi les patients consultant pour une IRA et prélevés par les médecins Sentinelles. L'incidence des cas de VRS parmi les patients consultant pour une IRA en médecine générale était **en diminution** par rapport à la semaine précédente et se situait à un **faible niveau d'activité**.

Vous pouvez retrouver le bulletin épidémiologique de Santé publique France avec l'ensemble des données de surveillance (ambulatoire et hospitalière) sur l'épidémie de bronchiolite en cliquant ici.











Situation observée en médecine générale pour la semaine 6 de l'année 2024, du 05 au 11/02/24

Taux d'incidence nationaux sur les trois dernières semaines (pour 100 000 habitants)	2024s06 (non consolidé) Estimation du taux d'incidence [Intervalle de confiance à 95%]	2024s05 Estimation du taux d'incidence [Intervalle de confiance à 95%]	2024s04 Estimation du taux d'incidence [Intervalle de confiance à 95%]
Infection Respiratoire Aiguë	443 [417; 469]	454 [431 ; 477]	469 [446 ; 492]
Diarrhée aiguë	97 [84; 110]	100 [89; 111]	106 [95; 117]
Varicelle	20 [14; 26]	13 [9; 17]	14 [10; 18]

Taux d'incidence régionaux pour la semaine 2024s06 (pour 100 000 habitants)	Infection Respiratoire Aiguë Estimation du taux d'incidence [Intervalle de confiance à 95%]	Diarrhée aiguë Estimation du taux d'incidence [Intervalle de confiance à 95%]	Varicelle Estimation du taux d'incidence [Intervalle de confiance à 95%]
Auvergne-Rhône-Alpes	463 [389; 537]	69 [44 ; 94]	10 [0; 21]
Bourgogne-Franche-Comté	473 [340 ; 606]	101 [40; 162]	6 [0; 21]
Bretagne	405 [314 ; 496]	117 [70; 164]	28 [9; 47]
Centre-Val de Loire	379 [284 ; 474]	100 [52; 148]	7 [0; 21]
Corse	347 [201 ; 493]	64 [13 ; 115]	0 [0;0]
Grand Est	493 [383 ; 603]	128 [80 ; 176]	11 [0; 23]
Hauts-de-France	413 [326 ; 500]	136 [88; 184]	20 [0; 40]
Ile-de-France	336 [291 ; 381]	72 [52; 92]	14 [5; 23]
Normandie	140 [88; 192]	32 [2; 62]	0 [0;0]
Nouvelle-Aquitaine	688 [586 ; 790]	126 [82; 170]	8 [0; 19]
Occitanie	384 [299 ; 469]	68 [35 ; 101]	56 [21; 91]
Pays de la Loire	471 [352; 590]	72 [30 ; 114]	20 [1; 39]
Provence-Alpes-Côte d'Azur	204 [119; 289]	44 [4; 84]	58 [4; 112]

Réseau Sentinelles

Institut Pierre Louis d'Epidémiologie et de Santé Publique

UMR-S 1136 (Inserm - Sorbonne Université)

Téléphone : 01 44 73 84 35 | Courriel : sentinelles@upmc.fr

Depuis 1984, le réseau Sentinelles est un réseau de recherche et de veille sanitaire en soins primaires (médecine générale et pédiatrie) en France métropolitaine. La participation des médecins libéraux est bénévole et volontaire. Actuellement, 590 médecins participent à l'activité de surveillance continue (543 généralistes et 47 pédiatres libéraux), permettant la réalisation des bulletins hebdomadaires.

Responsables du réseau Sentinelles : Olivier Steichen, Thierry Blanchon

Publication: Yves Dorléans

Système d'information et biostatistiques : Clément Turbelin

Surveillance continue et études ponctuelles : Marion Debin, Caroline Guerrisi

Antennes régionales	Responsables	
Auvergne-Rhône-Alpes,	Marianne Sarazin	
Bourgogne-Franche-Comté		
Centre-Val de Loire,	Thiores Dromunk	
Pays de la Loire	Thierry Prazuck	
Corse	Alessandra Falchi	
PACA	David Darmon	
Grand Est	Daouda Niaré	
Ile-de-France, Hauts-de-France	Mathilde François	
Bretagne, Normandie	Marie Pouquet	
Nouvelle-Aquitaine, Occitanie	Maryse Lapeyre-Mestre	

Voir toute l'équipe

Vous avez besoin d'information?

Vous pouvez consulter notre site internet :

https://www.sentiweb.fr/

N'hésitez pas à nous contacter aux coordonnées ci-contre

Vous êtes médecin généraliste ou pédiatre?

Vous pouvez rejoindre le réseau Sentinelles et participer à la recherche et à la veille sanitaire en soins primaires

https://www.sentiweb.fr/france/fr/inscrire

Envie de participer à la veille sanitaire?



Devenez acteur de la surveillance du Covid-19! Pas besoin d'être malade pour participer! Inscrivez-vous sur https://www.covidnet.fr/