



Actualité épidémiologique au 12/02/20, 2020s06 (du 03 au 09/02/20)

Syndromes Grippaux

Activité épidémique
en médecine générale



Carte d'interpolation spatiale des taux d'incidence départementaux




Taux d'incidence par semaine

En France métropolitaine, la semaine dernière (2020s06), le taux d'incidence des cas de syndromes grippaux vus en consultation de médecine générale a été estimé à 324 cas pour 100 000 habitants (IC 95% [303 ; 345]).


Au niveau régional, les taux d'incidence les plus élevés ont été observés en : Provence-Alpes-Côte d'Azur (562 [407 ; 717]), Nouvelle-Aquitaine (437 [350 ; 524]) et Auvergne-Rhône-Alpes (431 [362 ; 500]).

Diarrhée aiguë

Activité modérée à forte
en médecine générale



Carte d'interpolation spatiale des taux d'incidence départementaux




Taux d'incidence par semaine

En France métropolitaine, la semaine dernière (2020s06), le taux d'incidence des cas de diarrhée aiguë vus en consultation de médecine générale a été estimé à 142 cas pour 100 000 habitants (IC 95% [129 ; 155]).


Au niveau régional, les taux d'incidence les plus élevés ont été observés en : Provence-Alpes-Côte d'Azur (226 [134 ; 318]), Hauts-de-France (218 [149 ; 287]) et Nouvelle-Aquitaine (181 [131 ; 231]).

Varicelle

Activité faible
en médecine générale



Carte d'interpolation spatiale des taux d'incidence départementaux



Taux d'incidence par semaine


En France métropolitaine, la semaine dernière (2020s06), le taux d'incidence des cas de varicelle vus en consultation de médecine générale a été estimé à 15 cas pour 100 000 habitants (IC 95% [11 ; 19]).

Au niveau régional, les taux d'incidence les plus élevés ont été observés en Auvergne-Rhône-Alpes (35 [13 ; 57]), Nouvelle-Aquitaine (26 [3 ; 49]) et Centre-Val de Loire (24 [8 ; 40]).

Actualité épidémiologique au 12/02/20, 2020s06 (du 03 au 09/02/20)

Syndromes grippaux - Données complémentaires


Comparaison aux données historiques Activité comparable aux saisons passées



Taux d'incidence hebdomadaire des cas de syndromes grippaux vus en consultation de médecine générale depuis 2010 (pour 100 000 habitants)

L'activité actuelle des syndromes grippaux se situe autour de la médiane des incidences mesurées pour la même semaine lors des 10 dernières années.


Taux d'incidence par tranches d'âge Les moins de 15 ans principalement touchés



Taux d'incidence par tranches d'âge des syndromes grippaux pour les 2 dernières années, médecins généralistes Sentinelles

En semaine 2020s06, l'incidence est en augmentation dans toutes les tranches d'âge, et principalement chez les enfants et les adultes de moins de 65 ans.

Surveillance virologique des virus grippaux Légère augmentation de la circulation



Prélèvements positifs et taux de positivité pour les virus grippaux de cas de syndromes grippaux prélevés par les médecins Sentinelles (pédiatres et généralistes)

depuis la semaine 2019s40


Parmi les cas de syndromes grippaux vus par les médecins Sentinelles depuis le début de la surveillance virologique en semaine 2019s40, 1489 prélèvements naso-pharyngés ont été testés.

Parmi ces prélèvements, 583 (39,2%) étaient positifs pour un virus grippal : 317 virus de type A (16,6% A(H1N1)pdm09, 3,8% A(H3N2) et 1,0% de virus A non sous-typés) et 268 virus de type B (16,4% lignage Victoria, 0,5% lignage Yamagata et 1,1% de lignage non déterminé).

En semaine 2020s06, parmi les 105 prélèvements testés, 71 (67,6%) étaient positifs pour un virus grippal (34 virus de type A et 38 virus de type B).

Le taux de positivité est toujours en augmentation cette semaine.

Prévisions Augmentation modérée de l'activité



Prévision de l'évolution du taux d'incidence des syndromes grippaux

dans les prochaines semaines

Selon les modèles de prévision reposant sur les données historiques et sur les délivrances de médicaments (partenariat IQVIA), **l'incidence des syndromes grippaux pourrait continuer à augmenter légèrement ou rester stable dans les prochaines semaines.**

Conclusion générale

La surveillance de la grippe est effectuée à différents niveaux (population générale, soins primaires, hôpitaux, décès) par différents acteurs, afin de disposer d'une vision globale sur la situation de la grippe en France métropolitaine. L'ensemble des données disponibles sur les infections respiratoires hivernales est analysé conjointement par Santé publique France, le Centre national de référence des virus respiratoires (dont la grippe) et le réseau Sentinelles.

Au regard de l'ensemble de ces informations, les conclusions pour la semaine dernière (2020s06) sont :


- Augmentation modérée des indicateurs de l'activité grippale
- Co-circulation des virus A(H1N1)pdm09 et B/Victoria en métropole
- Guyane : début de l'épidémie
- Légère progression de la couverture vaccinale des personnes à risque en comparaison de la saison 2018-2019

A retrouver sur [Bulletin grippe Santé publique France](#).

Actualité épidémiologique au 12/02/20, 2020s06 (du 03 au 09/02/20)

Diarrhée aiguë - Données complémentaires


Comparaison aux données historiques
Activité comparable aux saisons précédentes



L'activité observée la semaine dernière se situe au niveau des incidences les plus faibles estimées pour la même semaine lors des 10 dernières années. Cette activité est en diminution pour la quatrième

L'activité observée la semaine dernière se situe au niveau des incidences les plus faibles estimées pour la même semaine lors des 10 dernières années. Cette activité est en diminution pour la quatrième semaine consécutive.

Description des cas rapportés




Concernant les cas rapportés : l'âge médian des cas était de 24 ans (de 1 mois à 99 ans). Les hommes représentaient 51% des cas.

Les tableaux cliniques rapportés par les médecins Sentinelles ne présentaient pas de signe particulier de gravité : le pourcentage d'hospitalisation a été estimé à 0,6% (IC 95% [0 ; 1,3]).

Les taux d'incidence sont en baisse dans toutes les tranches d'âge.

Evolution et prévision des incidences
Poursuite de la diminution de l'activité



Prévision des taux d'incidence de diarrhée aiguë pour les trois prochaines semaines par une méthode reposant sur les données historiques

Selon le modèle de prévision reposant sur les données historiques, l'incidence des diarrhées aiguës devrait continuer à diminuer dans les semaines prochaines.

Le point Hebdo GripeNet.fr du 12/02/20, n°2020s06 (données du 03/02/20 au 09/02/20)

GripeNet.fr : 6 044 personnes participent actuellement à la surveillance de la grippe en population générale

N'hésitez pas à devenir vous aussi acteur de cette surveillance, nous comptons sur vous !

Vous pouvez vous inscrire à tout moment (pas besoin d'être malade)

Syndromes grippaux

La semaine dernière, la proportion de participant(e)s présentant un syndrome grippal* a été estimée à 3,3%.

Ce taux est similaire aux taux observés les années précédentes à la même période, compris entre 2,6 et 5,4 % depuis la saison 2015/2016 (Figure 1).




Figure 1. Evolution des syndromes grippaux de la saison 2015-2016 à la saison 2019-2020, GripeNet.fr, 2020s06

Parmi les participant(e)s présentant un syndrome grippal, 35 % ont consulté un médecin généraliste, 4 % un pharmacien, 5 % les urgences, 1 % d'autres services médicaux et 55 % n'ont vu aucun professionnel de santé (Figure 2).




Figure 2. Consultation d'un professionnel de santé pour un syndrome grippal, GripeNet.fr, 2020s06

Etat de santé des participant(e)s la semaine dernière




Figure 3. Répartition de l'état de santé des participant(e)s, en % de participant(e)s, GripeNet.fr, 2020s06 (un participant(e) peut être inclus dans plusieurs catégories d'états de santé)

Focus sur les rhumes et gastroentérites

La semaine passée, il a été estimé que :

- 0,3 % des participant(e)s de GripeNet.fr présentaient des symptômes compatibles avec une gastroentérite* (Figure 3), et
- 4,8 % à un rhume* (Figure 3).

Parmi les participant(e)s ayant déclaré une gastroentérite, 63 % n'avaient pas vu de professionnels de santé, 21 % avaient vu un médecin généraliste, 5 % un pharmacien et 11 % un autre service médical.

Actualité épidémiologique au 12/02/20, 2020s06 (du 03 au 09/02/20)

Taux d'incidence nationaux sur les trois dernières semaines (pour 100 000 habitants)	2020s06 (non consolidé) Estimation du taux d'incidence [Intervalle de confiance à 95%]	2020s05 Estimation du taux d'incidence [Intervalle de confiance à 95%]	2020s04 Estimation du taux d'incidence [Intervalle de confiance à 95%]
Syndromes grippaux	324 [303 ; 345]	287 [271 ; 303]	185 [172 ; 198]
Diarrhée aiguë	142 [129 ; 155]	152 [140 ; 164]	187 [174 ; 200]
Varicelle	15 [11 ; 19]	13 [10 ; 16]	12 [9 ; 15]

Taux d'incidence régionaux pour la semaine 2020s06 (pour 100 000 habitants)	Syndromes grippaux Estimation du taux d'incidence [Intervalle de confiance à 95%]	Diarrhée aiguë Estimation du taux d'incidence [Intervalle de confiance à 95%]	Varicelle Estimation du taux d'incidence [Intervalle de confiance à 95%]
Auvergne-Rhône-Alpes	431 [362 ; 500]	130 [96 ; 164]	35 [13 ; 57]
Bourgogne-Franche-Comté	245 [167 ; 323]	113 [62 ; 164]	1 [0 ; 5]
Bretagne	390 [314 ; 466]	131 [88 ; 174]	3 [0 ; 7]
Centre-Val de Loire	258 [206 ; 310]	160 [117 ; 203]	24 [8 ; 40]
Corse	319 [225 ; 413]	60 [19 ; 101]	16 [0 ; 39]
Grand Est	326 [259 ; 393]	145 [101 ; 189]	9 [0 ; 18]
Hauts-de-France	319 [233 ; 405]	218 [149 ; 287]	13 [0 ; 28]
Ile-de-France	309 [258 ; 360]	50 [32 ; 68]	12 [3 ; 21]
Normandie	156 [94 ; 218]	133 [69 ; 197]	17 [0 ; 43]
Nouvelle-Aquitaine	437 [350 ; 524]	181 [131 ; 231]	26 [3 ; 49]
Occitanie	284 [215 ; 353]	89 [50 ; 128]	7 [0 ; 16]
Pays de la Loire	368 [267 ; 469]	142 [86 ; 198]	6 [0 ; 14]
Provence-Alpes-Côte d'Azur	562 [407 ; 717]	226 [134 ; 318]	11 [0 ; 25]

Réseau Sentinelles

Institut Pierre Louis d'Epidémiologie et de Santé Publique

UMR-S 1136 (Inserm - Sorbonne Université)

Téléphone : 01 44 73 84 35 | Courriel : sentinelles@upmc.fr

Depuis 1984, le réseau Sentinelles est un réseau de recherche et de veille sanitaire en soins primaires (médecine générale et pédiatrie) en France métropolitaine. La participation des médecins libéraux est bénévole et volontaire. Actuellement, 653 médecins participent à l'activité de surveillance continue (575 généralistes et 78 pédiatres libéraux), permettant la réalisation des bulletins hebdomadaires.

Responsables du réseau Sentinelles : Thomas Hanslik, Thierry Blanchon

Publication : Yves Dorléans

Système d'information et biostatistique : Corentin Hervé, Titouan Launay, Cécile Souty, Clément Turbelin, Ana Vilcu

Surveillance continue et études ponctuelles : Louise Rossignol, Caroline Guerrisi

Antenne régionale	Responsables & Epidémiologistes/Animateurs
Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté	Marianne Sarazin Caroline Liotard
Centre-Val de Loire, Pays de la Loire, Bretagne	Thierry Prazuck Charly Kengne-Kuetche, Romain Pons
Corse, PACA	Alessandra Falchi Shirley Masse, Natacha Villechenaud
Grand Est	Daouda Niaré
Ile-de-France, Hauts-de-France	Mathilde François Camille Bonnet, Jennifer Morice
Nouvelle-Aquitaine, Occitanie	Marion Debin

Vous avez besoin d'information ?

Vous pouvez consulter notre site internet :

<https://www.sentiweb.fr/>

N'hésitez pas à nous contacter aux coordonnées ci-contre

Vous êtes médecin généraliste ou pédiatre ?

Vous pouvez rejoindre le réseau Sentinelles et participer à la recherche et à la veille sanitaire en soins primaires

<https://www.sentiweb.fr/france/fr/inscrire>

Envie de participer à la veille sanitaire ?



Devenez acteur de la surveillance de la grippe !
Pas besoin d'être malade pour participer !
Inscrivez-vous sur <https://www.grippenet.fr/>