


Situation observée en médecine générale pour la semaine 51 de l'année 2022, du 19 au 25/12/22


## Infection respiratoire aiguë (IRA)

Covid-19, Grippe et autres virus respiratoires

Activité forte en médecine générale



Carte d'interpolation spatiale des taux d'incidence départementaux



Taux d'incidence par semaine

**En France métropolitaine**, la semaine dernière (2022s51), le taux d'incidence des cas d'infection respiratoire aiguë (IRA) vus en consultation de médecine générale a été estimé à **686 cas pour 100 000 habitants (IC 95% [647 ; 725])**. Ce taux est en **augmentation** par rapport à la semaine 2022s50 (données consolidées : 581 [552 ; 610]).

- Données complémentaires sur les IRA : page 2


- Données sur la Covid-19 : page 3

- Données nationales et régionales complètes : page 4


Les IRA sont dues à différents virus respiratoires comme le SARS-CoV-2 (Covid-19), les virus grippaux, ainsi qu'à d'autres virus respiratoires (VRS, rhinovirus ou métagonovirus). La surveillance des IRA a pour objectif le suivi des épidémies dues à ces virus.

## Diarrhée aiguë

Activité faible en médecine générale



Carte d'interpolation spatiale des taux d'incidence départementaux



Taux d'incidence national et comparaison avec les données historiques (\*)

**En France métropolitaine**, la semaine dernière (2022s51), le taux d'incidence des cas de diarrhée aiguë vus en consultation de médecine générale a été estimé à **60 cas pour 100 000 habitants (IC 95% [49 ; 71])**. Ce taux est en **légère diminution** par rapport à la semaine 2022s50 (données consolidées : 72 [60 ; 84]) et est à niveau d'activité inférieur à ceux observés habituellement en cette période.


Les données nationales et régionales complètes sont disponibles en dernière page de ce bulletin.

La surveillance des diarrhées aiguës a pour objectif le suivi des épidémies de gastro-entérites.


(\*) Les incidences des diarrhées aiguës durant les saisons 2019/2020 et 2020/2021 ont été fortement diminuées par les confinements et les mesures sanitaires de lutte contre la pandémie de Covid-19. Elles ne sont pas prises en compte dans les comparaisons historiques.

## Varicelle

Activité faible en médecine générale



Carte d'interpolation spatiale des taux d'incidence départementaux



Taux d'incidence national et comparaison avec les données historiques (\*)

**En France métropolitaine**, la semaine dernière (2022s51), le taux d'incidence des cas de varicelle vus en consultation de médecine générale a été estimé à **10 cas pour 100 000 habitants (IC 95% [6 ; 14])**. Ce taux est **stable** par rapport à la semaine 2022s50 (données consolidées : 10 [5 ; 15]) et est à un faible niveau d'activité par rapport à ceux observés habituellement en cette période.

Les données nationales et régionales complètes sont disponibles en dernière page de ce bulletin.

(\*) Les incidences des cas de varicelle durant les saisons 2019/2020 et 2020/2021 ont été fortement diminuées par les confinements et les mesures sanitaires de lutte contre la pandémie de Covid-19. Elles ne sont pas prises en compte dans les comparaisons historiques.

Situation observée en médecine générale pour la semaine 51 de l'année 2022, du 19 au 25/12/22

## Données complémentaires sur les infections respiratoires aiguës


### Modalités de la surveillance des IRA par le réseau Sentinelles

Chaque année, des virus à tropisme respiratoire circulent en France métropolitaine entraînant des infections respiratoires aiguës (IRA). Ces virus sont principalement les virus grippaux, et d'autres virus respiratoires comme le virus respiratoire syncytial (VRS), le rhinovirus ou le métapneumovirus, mais aussi le SARS-CoV-2 (COVID-19) depuis 2020. Ils nécessitent une surveillance rapprochée, car ils peuvent être la cause d'épidémies plus ou moins sévères.

Pour effectuer cette surveillance en médecine de ville, les médecins généralistes Sentinelles rapportent depuis le 17 mars 2020 le nombre de cas d'IRA vus en consultation (ou téléconsultation), selon la définition suivante : apparition brutale de fièvre (ou sensation de fièvre) et de signes respiratoires. Une surveillance virologique est également réalisée par les médecins généralistes et pédiatres Sentinelles, avec le prélèvement d'un échantillon des cas d'IRA vus en consultation, afin d'identifier les virus circulants.


Cette veille est effectuée en collaboration avec Santé publique France, le Centre national de référence (CNR) des infections respiratoires (Institut Pasteur à Paris et Hospices Civils de Lyon), et l'Université de Corse.

### Taux d'incidence des IRA par tranches d'âge



**La semaine dernière 2022s51**, les taux d'incidence sont en augmentation dans toutes les tranches d'âge sauf chez les 5-14 ans par rapport à la semaine précédente.

### Circulation des virus respiratoires en médecine générale et pédiatrie libérale



Nombre de prélèvements réalisés et taux de positivité des virus respiratoires à partir des cas d'IRA prélevés par les médecins Sentinelles depuis 2022s39


**La semaine dernière (2022s51)**, 221 patients présentant une IRA vus en consultation de médecine générale ou pédiatrie ont été prélevés dans le cadre de la surveillance Sentinelles (prélèvements salivaires et nasopharyngés). Ces prélèvements sont testés pour différents virus respiratoires, dont le SARS-CoV-2 (COVID-19) et les virus grippaux. Les résultats des tests virologiques effectués en fonction des semaines sont présentés dans le graphique ci-dessus et en détails ci-dessous :

- 141/218 (64,7%) étaient positifs pour **un virus grippal** (données consolidées pour 2022s50 : 150/271 (55,4%)) ;
- 15/218 (6,9%) étaient positifs au **SARS-CoV-2 (COVID-19)** (données consolidées pour 2022s50 : 25 /271 (9,2%)) ;
- 18/218 (8,3%) étaient positifs au **virus respiratoire syncytial (VRS)** (données consolidées pour 2022s50 : 22/271 (8,1%)) ;
- 12/218 (5,5%) étaient positifs au **rhinovirus (hRV)** (données consolidées pour 2022s50 : 12/270 (4,4%)) ;
- 9/218 (4,1%) étaient positifs au **métapneumovirus (hMPV)** (données consolidées pour 2022s50 : 18/271 (6,6%)).

**Depuis la semaine 2022s39** (26 septembre 2022), 2 271 patients présentant une IRA vus en consultation de médecine générale et pédiatrie libérale ont été prélevés.

**9 co-infections "Grippe+COVID-19" et 1 co-infection "Grippe+COVID-19+VRS"** ont été observées. Les co-infections A(H3N2)/SARS-CoV-2 ont été observées entre les semaines 2022s42 et 2022s51. La triple co-infection A(H3N2)/SARS-CoV-2/VRS a été observée en semaine 2022s50.

### Evolution des incidences des IRA par régions



Taux d'incidence hebdomadaire des IRA par régions sur les neuf dernières semaines  
Les taux d'incidence régionale des IRA estimés pour la semaine dernière 2022s51 sont disponibles en dernière page du bulletin.

### En conclusion

L'incidence des cas d'IRA vus en consultation de médecine générale poursuit son augmentation. Cette augmentation a été observée dans la majorité des régions et dans toutes les tranches d'âge à l'exception des 5 - 14 ans (voir graphique ci-contre).

Cette incidence des IRA est liée à la circulation concomitante de différents virus respiratoires la semaine dernière (2022s51), en particulier les virus grippaux (voir page 4), le virus respiratoire syncytial (VRS) (voir page 5) et le SARS-CoV-2 (Covid-19) (voir page 3), mais aussi le rhinovirus (hRV) et le métapneumovirus (hMPV) (voir graphique ci-contre).

Situation observée en médecine générale pour la semaine 51 de l'année 2022, du 19 au 25/12/22

**Covid-19**

**Modalités de la surveillance de la Covid-19 par le réseau Sentinelles**


Le réseau Sentinelles contribue à la surveillance de l'épidémie de Covid-19 grâce à la surveillance des cas d'infection respiratoire aiguë (IRA) vus en consultation de médecine générale (*définie par une fièvre ou une sensation de fièvre accompagnée de signes respiratoires*).

Pour chaque patient présentant une IRA déclaré par les médecins généralistes Sentinelles, des données descriptives sont recueillies, dont les résultats des tests diagnostiques vis-à-vis de la Covid-19 (RT-PCR ou test antigénique).

À partir de ces informations, il est possible d'estimer le nombre de cas de Covid-19 présentant des signes respiratoires vus en consultations de médecine générale. Ces cas représentent une part majoritaire de l'ensemble des cas de Covid-19 vus en consultation de médecine générale. Il est toutefois important de noter que les cas de Covid-19 ne présentant pas de signes respiratoires ne sont pas inclus dans nos estimations (comme par exemple ceux ne présentant qu'une agueusie ou une anosmie isolée).

Cet indicateur permet de disposer d'estimations comparables au cours du temps pour surveiller la dynamique de l'épidémie.


**Taux de positivité des IRA au SARS-CoV-2 (Covid-19) par tranches d'âge**



Nombre d'IRA déclarées par les médecins Sentinelles et taux de positivité au SARS-CoV-2 (Covid-19) depuis 2020s37

**La semaine dernière (2022s51)**, le taux de positivité au SARS-CoV-2 (Covid-19) des patients consultant pour une IRA était de 2%, 6% et 21%, respectivement chez les 0-14, 15-64 et 65 ans et plus.

**Estimation de l'incidence des cas de Covid-19 présentant des signes respiratoires**



Taux d'incidence des cas de Covid-19 présentant des signes respiratoires vus en médecine générale depuis 2020s37

**La semaine dernière (2022s51)**, le taux d'incidence des cas de Covid-19 présentant des signes respiratoires vus en consultation de médecine générale a été estimé à 47 cas pour 100 000 habitants (IC 95% [36 ; 58]), ce qui représente 31 271 [24 043 ; 38 499] nouveaux cas de Covid-19 présentant des signes respiratoires ayant consulté un médecin généraliste.

Ce taux est en légère baisse depuis deux semaines (données consolidées pour 2022s50 et 2022s49 respectivement : 51 [42 ; 60] et 56 [47 ; 65], soit 33 845 [27 726 ; 39 964] et 37 256 [31 280 ; 43 232] nouveaux cas de Covid-19 présentant des signes respiratoires vus en médecine générale).

**Description clinique des cas de Covid-19 présentant des signes respiratoires**

Depuis la semaine 2022s21 (fin mai 2022, date du début de la septième vague due aux infections par les sous-lignages BA.4 et BA.5 du variant Omicron), les 3 195 cas de Covid-19 présentant des signes respiratoires vus par les médecins généralistes Sentinelles présentaient les caractéristiques suivantes :

- Leur âge médian était de 53 ans (allant de 3 mois à 105 ans) et 57% (1 793/3 149) étaient des femmes ;
- 14,3% (385/2 694) des patients âgés de 12 ans ou plus n'étaient pas vaccinés contre la Covid-19 (aucune dose de vaccin reçue) ;
- 30% (784/2 616) avaient des facteurs de risque de complication ;
- 1,2% (32/2 640) ont été hospitalisés à l'issue de leur consultation.

**En conclusion**

L'incidence des cas de Covid-19 présentant des signes respiratoires vus en consultation de médecine générale est en légère baisse depuis deux semaines, et reste à des niveaux modérés en comparaison aux vagues épidémiques passées observées depuis mars 2020 (voir graphique ci-contre).


Les caractéristiques des cas d'IRA positifs au SARS-CoV-2 (Covid-19) observés depuis la semaine 2022s21 en médecine générale restent similaires à celles des cas observés depuis le début de la pandémie.

Vous pouvez retrouver le bulletin épidémiologique de Santé publique France avec l'ensemble des données de surveillance (ambulatoire et hospitalière) sur l'épidémie Covid-19 en cliquant [ici](#).

Situation observée en médecine générale pour la semaine 51 de l'année 2022, du 19 au 25/12/22

## GRIPPE


### Taux de positivité des IRA à la grippe par tranches d'âge



Nombre de prélèvements et taux de positivité à la grippe par âge des patients prélevés pour une IRA par les médecins Sentinelles depuis 2022s39

**La semaine dernière (2022s51)**, les taux de positivité à la grippe des patients consultant pour une IRA et prélevés par les médecins Sentinelles étaient de 74% et 62% respectivement chez les 0-14 ans et 15 ans et plus.

### Estimation de l'incidence des cas de grippe présentant une fièvre >39



Taux d'incidence des cas de grippe présentant une fièvre >39 vus en médecine générale depuis 2022s39 (bleu) comparé aux saisons passées depuis 2014 (gris)

**La semaine dernière (2022s51)**, le taux d'incidence des cas de grippe présentant une fièvre >39 vus en consultation de médecine générale était en forte augmentation par rapport à ceux des dernières semaines, et à un niveau d'activité supérieur aux saisons passées à la même période.

### Circulation de la grippe par région

**La semaine dernière (2022s51)**, parmi les 218 prélèvements testés 141 (64,7%) étaient positifs pour au moins un virus grippal. Des cas de grippe ont été identifiés dans toutes les régions métropolitaines, et en particulier en :

- Bretagne (18/23 prélèvements testés, soit 78,3%),
- Ile-de-France (29/39 prélèvements testés, soit 74,4%),
- Centre-Val de Loire (10/14 prélèvements testés, soit 71,4%),
- Hauts-de-France (16/23 prélèvements testés, soit 69,6%),
- Nouvelle-Aquitaine (9/13 prélèvements testés, soit 69,2%)
- Pays de la Loire (6/9 prélèvements testés, soit 66,7%)
- Normandie (4/6 prélèvements testés, soit 66,7%).

### Estimation de l'incidence des cas de grippe vus en médecine générale

**La semaine dernière (2022s51)**, le taux d'incidence des cas de grippe vus en consultations de médecine générale a été estimé à 419 cas pour 100 000 habitants (IC 95% [365; 474]), ce qui représente 277 995 [241 749; 314 241] nouveaux cas de grippe ayant consulté un médecin généraliste.

Ce taux est forte augmentation par rapport à ceux des dernières semaines (données consolidées pour 2022s50 : 289 [256; 321], soit 191 323 [169 593; 213 053] nouveaux cas de grippe vus en médecine générale).

### Description des cas de grippe

Depuis la reprise de la surveillance virologique en semaine 2022s39 (26 septembre), les 561 cas confirmés de grippe vus par les médecins généralistes et les pédiatres Sentinelles présentaient les caractéristiques suivantes :

#### Description clinique des cas confirmés de grippe :

- Leur âge médian était de 22 ans (de 3 mois à 85 ans) ;
- 53,5% (298/557) étaient des femmes ;
- 93% (507/543) des personnes n'étaient pas vaccinées contre la grippe ;
- 16% (74/458) avaient des facteurs de risque de complication ;
- 0,4% (2/446) ont été hospitalisés à l'issue de la consultation.

#### Identification des virus grippaux circulants

Les 560 virus grippaux identifiés depuis le début de la surveillance virologique se répartissaient ainsi :

- 57/560 (10,2 %) virus grippal A(H1N1)pdm09 ;
- 441/560 (78,8%) virus grippal A(H3N2) ;
- 26/560 (4,6%) virus grippal de type A non encore sous-typé ;
- 22/560 (3,9%) virus grippal de type B de lignage Victoria ;
- 15/560 (2,7%) virus grippal de type B dont le lignage n'a pas encore été identifié.

### En conclusion

La semaine dernière (2022s51), la circulation des virus grippaux était en forte augmentation par rapport à la semaine précédente, atteignant des niveaux d'intensité supérieurs à ceux observés les saisons passées à la même période. Cette circulation s'étendait à l'ensemble des régions françaises métropolitaines (voir graphiques ci-contre et texte ci-dessus).


Pour le moment, les virus grippaux circulant de façon prédominante sont de type A, avec le sous-type A(H3N2) majoritairement. Les caractéristiques des cas de grippe sont proches de celles des cas positifs de grippe observés lors des saisons passées en consultation de médecine générale (données historiques : âge médian : 24 ans ; 50% de femmes ; 92% de personnes non vaccinées contre la grippe ; 14% présentant des facteurs de risque ; 0,3% de patients hospitalisés).

Vous pouvez retrouver le bulletin épidémiologique de Santé publique France avec l'ensemble des données de surveillance (ambulatoire et hospitalière) sur l'épidémie de grippe en cliquant [ici](#).

## Situation observée en médecine générale pour la semaine 51 de l'année 2022, du 19 au 25/12/22

### VRS


#### Taux de positivité des IRA au VRS par tranches d'âge



Nombre de prélèvements et taux de positivité au VRS par âge des patients prélevés pour une IRA par les médecins Sentinelles depuis 2022s39

**La semaine dernière (2022s51)**, les taux de positivité au VRS des patients consultant pour une IRA et prélevés par les médecins Sentinelles étaient de 9,8% et 8% respectivement chez les 0-14 ans et 15 ans et plus.

#### Estimation de l'incidence des cas de VRS présentant une fièvre >39



Taux d'incidence des cas de VRS (avec fièvre >39) depuis 2022s39 (bleu) au regard des saisons passées depuis 2014 (gris)

**La semaine dernière (2022s51)**, le taux d'incidence des cas de VRS présentant une fièvre >39 vus en consultation de médecine générale était stable par rapport à ceux des dernières semaines, et légèrement supérieur par rapport aux saisons passées à la même période.

#### Circulation du VRS par région

**La semaine dernière (2022s51)**, parmi les 218 prélèvements testés 18 (8,3%) étaient positifs pour le virus respiratoire syncytial (VRS). Des cas de VRS ont été identifiés dans toutes les régions métropolitaines, et en particulier en :

- Nouvelle-Aquitaine (3/13 prélèvements testés, soit 23%),
- Bourgogne-Franche-Comté (2/9 prélèvements testés, soit 22%),
- Centre-Val de Loire (2/14 prélèvements testés, soit 14,3%),
- Grand Est (3/21 prélèvements testés, soit 14%),
- Occitanie (2/16 prélèvements testés, soit 12,5%),
- PACA (1/11 prélèvements testés, soit 9%).
- Ile-de-France (3/39 prélèvements testés, soit 7,7%),
- Bretagne (1/23 prélèvements testés, soit 4,3%).

#### Estimation de l'incidence des cas de VRS vus en médecine générale

**La semaine dernière (2022s51)**, le taux d'incidence des cas de VRS vus en consultations de médecine générale a été estimé à 54 cas pour 100 000 habitants (IC 95% [39 ; 70]), ce qui représente 35 970 [ 25 547 ; 46 393 ] nouveaux cas de VRS ayant consulté un médecin généraliste.

Ce taux est stable par rapport à ceux des dernières semaines (données consolidées pour 2022s50 et 2022s49 respectivement : 44 [31 ; 57] et 54 [43 ; 65], soit 29 290 [20 768 ; 37 812] et 35 825 [28 717 ; 42 933] nouveaux cas de VRS vus en médecine générale).

#### Description des cas de VRS

Depuis la reprise de la surveillance virologique en semaine 2022s39 (26 septembre), les 274 (12,3%) cas confirmés de VRS vus par les médecins généralistes et les pédiatres Sentinelles présentaient les caractéristiques suivantes :

- Leur âge médian était de 27 ans (de 3 mois à 84 ans) ;
- 157/272 (57,7%) étaient des femmes ;
- 46/245 (18,8%) avaient des facteurs de risque de complication ;
- 1/230 (0,4%) a été hospitalisé à l'issue de la consultation.

Ces caractéristiques sont proches de celles des cas positifs de VRS observés lors des saisons passées en consultation de médecine générale, avec des cas témoins plus âgés cette saison que les cas observés lors des saisons précédentes (données historiques : âge médian : 3 ans ; 52% de femmes ; 23% présentant des facteurs de risque ; 0,6% de patients hospitalisés).

#### En conclusion

La semaine dernière (2022s51), l'incidence du VRS parmi les patients consultant pour une IRA en médecine générale était stable par rapport aux semaines précédentes, atteignant des niveaux légèrement supérieurs à ceux habituellement rencontrés en cette période de l'année.

Vous pouvez retrouver le bulletin épidémiologique de Santé publique France avec l'ensemble des données de surveillance (ambulatoire et hospitalière) sur l'épidémie de bronchiolite en cliquant [ici](#).

## Situation observée en médecine générale pour la semaine 51 de l'année 2022, du 19 au 25/12/22

Taux d'incidence nationaux sur les trois dernières semaines (pour 100 000 habitants)	2022s51 (non consolidé) Estimation du taux d'incidence [Intervalle de confiance à 95%]	2022s50 Estimation du taux d'incidence [Intervalle de confiance à 95%]	2022s49 Estimation du taux d'incidence [Intervalle de confiance à 95%]
Infection Respiratoire Aiguë	686 [647 ; 725]	581 [552 ; 610]	446 [422 ; 470]
Diarrhée aiguë	60 [49 ; 71]	72 [60 ; 84]	68 [59 ; 77]
Varicelle	10 [6 ; 14]	10 [5 ; 15]	8 [5 ; 11]

Taux d'incidence régionaux pour la semaine 2022s51 (pour 100 000 habitants)	Infection Respiratoire Aiguë Estimation du taux d'incidence [Intervalle de confiance à 95%]	Diarrhée aiguë Estimation du taux d'incidence [Intervalle de confiance à 95%]	Varicelle Estimation du taux d'incidence [Intervalle de confiance à 95%]
Auvergne-Rhône-Alpes	440 [351 ; 529]	41 [16 ; 66]	16 [5 ; 27]
Bourgogne-Franche-Comté	486 [329 ; 643]	42 [0 ; 87]	17 [1 ; 33]
Bretagne	928 [719 ; 1137]	97 [25 ; 169]	0 [0 ; 0]
Centre-Val de Loire	783 [580 ; 986]	17 [0 ; 75]	26 [0 ; 62]
Corse	216 [81 ; 351]	76 [8 ; 144]	84 [0 ; 170]
Grand Est	971 [737 ; 1205]	61 [9 ; 113]	40 [0 ; 88]
Hauts-de-France	1032 [873 ; 1191]	98 [51 ; 145]	0 [0 ; 0]
Ile-de-France	547 [464 ; 630]	35 [16 ; 54]	0 [0 ; 0]
Normandie	225 [134 ; 316]	26 [0 ; 58]	1 [0 ; 5]
Nouvelle-Aquitaine	580 [450 ; 710]	36 [7 ; 65]	0 [0 ; 0]
Occitanie	469 [354 ; 584]	55 [23 ; 87]	0 [0 ; 1]
Pays de la Loire	558 [416 ; 700]	80 [4 ; 156]	0 [0 ; 0]
Provence-Alpes-Côte d'Azur	708 [552 ; 864]	51 [0 ; 104]	12 [0 ; 28]

## Réseau Sentinelles

**Institut Pierre Louis d'Epidémiologie et de Santé Publique**  
UMR-S 1136 (Inserm - Sorbonne Université)

Téléphone : 01 44 73 84 35 | Courriel : [sentinelles@upmc.fr](mailto:sentinelles@upmc.fr)

Depuis 1984, le réseau Sentinelles est un réseau de recherche et de veille sanitaire en soins primaires (médecine générale et pédiatrie) en France métropolitaine. La participation des médecins libéraux est bénévole et volontaire. Actuellement, 601 médecins participent à l'activité de surveillance continue (549 généralistes et 52 pédiatres libéraux), permettant la réalisation des bulletins hebdomadaires.

**Responsables du réseau Sentinelles** : Olivier Steichen, Thierry Blanchon

**Publication** : Yves Dorléans

**Système d'information et biostatistiques** : Clément Turbelin

**Surveillance continue et études ponctuelles** : Marion Debin, Caroline Guerrisi

Antennes régionales	Responsables
Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté	Marianne Sarazin
Centre-Val de Loire, Pays de la Loire	Thierry Prazuck
Corse	Alessandra Falchi
PACA	David Darmon
Grand Est	Daouda Niaré
Ile-de-France, Hauts-de-France	Mathilde François
Bretagne, Normandie	Marie Pouquet
Nouvelle-Aquitaine, Occitanie	Maryse Lapeyre-Mestre

[Voir toute l'équipe](#)

### Vous avez besoin d'information ?

Vous pouvez consulter notre site internet :

<https://www.sentiweb.fr/>

N'hésitez pas à nous contacter aux coordonnées ci-contre

### Vous êtes médecin généraliste ou pédiatre ?

Vous pouvez rejoindre le réseau Sentinelles et participer à la recherche et à la veille sanitaire en soins primaires

<https://www.sentiweb.fr/france/fr/inscrire>

### Envie de participer à la veille sanitaire ?

**covidnet.fr**

Devenez acteur de la surveillance du Covid-19 !

Pas besoin d'être malade pour participer !

Inscrivez-vous sur <https://www.covidnet.fr/>