


Bilan annuel 2015


Janvier - décembre 2015

Nous tenons à vous remercier chaleureusement pour votre participation active et régulière tout au long de l'année 2015

Nombre de MG Sentinelles par région ayant participé à la surveillance continue, 2015



Nombre de MG Sentinelles par département ayant participé à la surveillance continue, 2015




Syndromes grippaux


2015 : Taux d'incidence = **5 392 cas / 100 000 hab** (IC95% : 5 396 – 5 588)

Sexe-ratio H/F = 0,9

Age médian (Min-Max) = 32 ans (2 mois - 100 ans)



Taux d'incidence hebdomadaires des syndromes grippaux, 2015
(intervalle de confiance à 95% ; seuil épidémique en rouge)




Taux d'incidence hebdomadaires des cas de syndromes grippaux selon l'âge, 2015

Grippe : épidémie 2015/2016


Taux d'incidence = **3 465 cas / 100 000 hab** (IC95% : 3 390 – 3 540)

Sexe-ratio H/F = 0,95

Age médian (Min-Max) = 20 ans (3 mois - 101 ans)



Taux d'incidence cumulé des cas de syndromes grippaux
durant les épidémies de grippe depuis 1984 (intervalle de confiance à 95%)



Taux de positivité pour les virus grippaux, types et sous-types durant la campagne de surveillance virologique des syndromes grippaux


Bilan complet de l'épidémie : [cliquez ici](#)

Diarrhées aiguës


2015 : Taux d'incidence = **6 620 cas / 100 000 hab** (IC95% : 6 501 – 6 739)

Sexe-ratio H/F = 1

Age médian (Min-Max) = 24 ans (1 mois - 102 ans)



Taux d'incidence hebdomadaires des diarrhées aiguës, 2015
(intervalle de confiance à 95% ; seuil épidémique en rouge)



Taux d'incidence hebdomadaires des cas de diarrhées aiguës selon l'âge, 2014

Depuis quelques années, les épidémies de gastro-entérites ne sont plus détectées par la méthode de calcul historique, à cause de la diminution de leur niveau d'incidence. En 2015, la méthode de calcul a été adaptée pour permettre la détection des épidémies. Pour plus d'informations sur la méthode de calcul, rendez-vous page 83 du bilan annuel 2015.


Bilan annuel 2015

Gastroentérite : épidémie 2015/2016


Taux d'incidence = **1 060 cas / 100 000 hab** (IC95% : 1 019 – 1 101)

Sexe-ratio H/F = 0,9

Age médian (Min-Max) = 25 ans (2 mois - 97 ans)



Taux d'incidence cumulé des cas de diarrhée aiguë durant les épidémies de gastroentérites depuis 1990 (intervalle de confiance à 95%)




Taux d'incidence hebdomadaire des diarrhées aiguës depuis 1990 (pour 100 000 habitants). En bleu : saison 2015-2016, en gris : saisons de 1990 à 2014 (plus les courbes sont claires, plus les données sont anciennes)

Bilan complet de l'épidémie : [cliquez ici](#)


Varicelle

ACTIVITE STABLE

2015 : Taux d'incidence = **1 007 cas / 100 000 hab** (IC95% : 961 – 1 053)
 Sexe-ratio H/F = 0,9
 Age médian (Min-Max) = 3 ans (1 mois – 91 ans)
 Adultes (20 ans et plus) = 2,9% des cas
 Contage = 81,1 % repérés, en premier lieu à l'école (42%) puis au sein de la famille (29,3%)
 Complications = 1,7% des cas, principalement d'ordre cutané, respiratoire et ORL
 Hospitalisation = 0,2% des cas



Taux d'incidence annuel de varicelle, 1991 - 2015




Distribution des cas de varicelle selon l'âge, 2015

Zona


ACTIVITE STABLE

2015 : Taux d'incidence = **419 cas / 100 000 hab** (IC95% : 388 – 450)
 Sexe-ratio H/F = 0,7
 Age médian (Min-Max) = 60 ans (9 mois – 100 ans)
 Zona ophtalmique = 5,5% des cas
 Traitement antiviral = 77,2% des cas (56,7% par voie générale)
 Hospitalisation = 0,6% des cas



Taux d'incidence annuel de zona, 2006 - 2015

sexe Féminin Masculin



Distribution des cas de zona selon l'âge et le sexe, 2015

Oreillons

ACTIVITE STABLE

2015 : Taux d'incidence = **14 cas / 100 000 hab** (IC95% : 9 – 19)


Sexe-ratio H/F = 0,8

Age médian (Min-Max) = 13 ans (3 ans – 66 ans)


La parotidite est l'unique forme clinique décrite

Vaccination : 76% des cas

Sur 16 cas prélevés, un seul positif au virus ourlien (6,3%)



Taux d'incidence annuel des oreillons, 1985 - 2015



Distribution des cas d'oreillon selon l'âge, 2015

Urétrite masculine

ACTIVITE STABLE

2015 : Taux d'incidence = **204 cas / 100 000 hommes (15 ans et plus)** (IC95% : 172-236)

Age médian (Min-Max) = 33,5 ans (17 ans – 85 ans)


Antécédent d'IST au cours des 12 derniers mois : 20,4% des cas

34 Gonocoques / 98 cas testés


31 Chlamydiae / 99 cas testés

3 Trichomonas / 79 cas testés

Co-infections gonocoque/chlamydia : 6 cas



Taux d'incidence annuel des urétrites masculines, 1985 - 2015



Distribution des cas des urétrites masculines selon l'âge, 2015

Borréliose de Lyme

ACTIVITE STABLE


2015 : Taux d'incidence = **51 cas / 100 000 hab** (IC95% : 38 – 64)

Sexe-ratio H/F = 0,7

Age médian (Min-Max) = 52 ans (1 an – 89 ans)

98,1% avec un érythème migrant

Notion de piqûre = 75,3% des cas



Taux d'incidence hebdomadaire de borréliose de Lyme, 2009 - 2015

Région	Taux d'incidence pour 100 000 habitants et IC95%
Limousin	516 [135 ; 897]
Alsace	183 [66 ; 300]
Lorraine	128 [0 ; 314]
Franche-Comté	117 [28 ; 206]
Aquitaine	102 [6 ; 198]
Midi-Pyrénées	82 [19 ; 145]
Rhône-Alpes	65 [37 ; 93]
Champagne-Ardenne	48 [0 ; 106]
Auvergne	47 [6 ; 88]
Ile-de-France	38 [16 ; 60]

Les 10 taux d'incidence régionaux les plus élevés pour la borréliose de Lyme, 2015

Tentatives de suicides

ACTIVITE STABLE

2015 : Taux d'incidence = **43 cas / 100 000 hab** (IC95% : 34 – 53)

Sexe-ratio H/F = 1

Age médian (Min-Max) = 41 ans (8 ans – 82 ans)

Modalité de la tentative de suicide : 66,2% des cas par médicaments

Antécédent de tentatives de suicide	Proportion (%)
Oui	38,7
Non	61,3

Date de la dernière consultation avec le patient	Proportion (%)
< 1 semaine	15,5
1 – 4 semaines	36,2
1 – 6 mois	39,7
> 6 mois	8,6

Suicides

ACTIVITE STABLE

2015 : Taux d'incidence = 17 cas / 100 000 hab (IC95% : 11 – 23)

Sexe-ratio H/F = 2

Age médian (Min-Max) = 49 ans (12 ans – 92 ans)

Antécédent de tentatives de suicide : 22,7% des cas

Modalité du suicide : 46,2% par pendaison

Souffrance psychologique repérée dans les 12 derniers mois	Proportion (%)
Oui	68,4
Non	31,6

Date de la dernière consultation avec le patient	Proportion (%)
< 1 semaine	36,8
1 – 4 semaines	10,5
1 – 6 mois	36,8
> 6 mois	15,8

Sentinelles

Réseau Sentinelles

[Le bilan annuel 2015 complet est disponible :](#)
[cliquez ici](#)

**Un grand merci
pour votre participation au réseau!**

